

# Nirsévimab (Beyfortus<sup>®</sup>) dans la prévention des bronchiolites à virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés et les nourrissons pour la période épidémique 2023-2024

Le Beyfortus<sup>®</sup> est mis à disposition sur prescription médicale (médecin, sage-femme) sans facturation aux familles.

L'injection est réalisée par un médecin, une sage-femme ou un(e) infirmier(e).

**À compter du 15 septembre 2023, en métropole**

**Pour tous les nouveau-nés et nourrissons nés depuis le 6 février 2023**

**Pour tous les nouveau-nés avant leur sortie de maternité**

## Mode d'emploi

- 1 seule injection par voie intramusculaire.
- Sur la face antéro-latérale de la cuisse.
- si poids < 5 kg : 1 dose de 50 mg.
- si poids ≥ 5 kg : 1 dose de 100 mg.

*Pour les situations cliniques particulières : se référer au RCP*

## Précautions d'emploi – Contre-indication

- En cas d'administration le même jour qu'un vaccin prévu au calendrier vaccinal de l'enfant, la distance séparant les deux sites d'injection sera d'au moins 2,5 cm si sur la face antéro-latérale de la même cuisse.
- L'injection n'est pas recommandée en cas de fièvre ou d'épisode infectieux aiguë modérée à sévère en cours, ni après un épisode d'infection documentée à VRS.
- Il convient de faire preuve de prudence lors de l'administration intramusculaire à des nourrissons atteints de thrombopénie, d'un trouble de la coagulation ou sous traitement anticoagulant.
- Une hypersensibilité connue à un des composants du médicament constitue une contre-indication à l'administration de cet anticorps monoclonal.

*Voir liste des excipients dans le RCP*

## Tolérance – Effets indésirables

- Éruption cutanée (rash) ; fièvre.
- Réactions au site d'injection (induration, œdème, douleur).
- Autre : des réactions graves d'hypersensibilité, notamment des cas d'anaphylaxie ont été observées avec des anticorps monoclonaux.
- Déclaration des effets indésirables.

• Réponse rapide HAS « Nirsévimab (Beyfortus<sup>®</sup>) dans la prévention des bronchiolites à virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés et nourrissons ».

- Lettre « ANSM » aux professionnels.
- DGS-URGENT.
- RCP Beyfortus<sup>®</sup>.