HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Recueil d'indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de soins de suite ou de réadaptation

Indicateur en expérimentation :

Prise en Charge de la Douleur

Consignes de remplissage

Grille de recueil

Indicateur PCD - SSR

Direction de l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins
Service Indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IPAQSS)

SOMMAIRE

CONSIGNES DE REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE ..... **p 3**

GRILLE DE RECUEIL ..... **p 6**

CONSIGNES DE REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE

<table>
<tr><th>N°</th><th>Libellés de la grille</th><th>Instructions</th></tr>
<tr><td colspan="3">Indicateur en expérimentation à remplir uniquement par les établissements volontaires :
Prise en Charge de la Douleur (PCD - SSR)</td></tr>
<tr><td>EXP_PCD SSR 1</td><td>Une évaluation de la douleur est tracée dans le dossier du patient</td><td>L'évaluation de la douleur est recherchée dans tous les éléments du dossier du patient relevant du séjour analysé.
Cocher « Oui » lorsque le résultat d'une mesure de la douleur à l'aide d'une échelle ou lorsqu'un commentaire sur l'état douloureux est retrouvé.
Cocher « Non » lorsqu'aucun commentaire ni résultat d'une mesure de la douleur à l'aide d'une échelle n'est retrouvés.</td></tr>
<tr><td>EXP_PCD SSR 2</td><td>Si oui cette évaluation a été réalisée avec une échelle</td><td>Cette question ne s'affiche que si réponse « Oui » à la question EXP_PCD SSR 1
Cocher « OUI » si l'évaluation a été réalisée avec l'une des échelles suivantes :
Echelle Verbale Simple (EVS),
Echelle Numérique simple en cm (ENS),
Echelle Numérique en mm (EN),
Echelle Visuelle Analogique en cm (EVA),
Echelle Visuelle Analogique en mm (EVA),
Algoplus (échelle de 0 à 5),
FLACC (échelle de 0 à 10),
Cheops (score de 4 à 13),
Echelle des visages (0 à 10),
Échelle locale validée par le CLUD.</td></tr>
<tr><td>EXP_PCD SSR 3</td><td>Date de réalisation de la première évaluation de la douleur</td><td>Noter la date de la première évaluation de la douleur retrouvée dans le dossier du patient.</td></tr>
<tr><td>EXP_PCD SSR 4</td><td>Cette première évaluation montre que le patient est algique (EVA > 3, voir correspondance des échelles)</td><td>Cocher « OUI » si l'évaluation correspond à « Douleur Modérée », « Douleur intense » ou « Douleur insupportable » quelle que soit l'échelle utilisée.
<table>
<tr><th>Modalité à cocher</th><th>Score</th><th>Pas de douleur</th><th>Douleur faible</th><th>Douleur modérée</th><th>Douleur intense</th><th>Douleur insupportable</th></tr>
<tr><td>Echelle Verbale Simple</td><td>0 - 4</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>EN ou EVA (en mm)</td><td>0 - 100</td><td>0</td><td>1 - 34</td><td>35 - 59</td><td>60 - 79</td><td>80 -100</td></tr>
<tr><td>ENS ou EVA (en cm)</td><td>0 - 10</td><td>0</td><td>1 - 3</td><td>4 - 5</td><td>6 - 7</td><td>8 -10</td></tr>
<tr><td>Autres échelles</td><td></td><td>Pas de douleur</td><td>Faible</td><td>Modérée</td><td>Forte</td><td>Insupportable</td></tr>
</table>
Cocher « NON » si l'évaluation correspond à « Pas de douleur » ou « Douleur faible ».</td></tr>
</table>

EXP_PCD SSR 5	Pour les patients algiques une stratégie de prise en charge de la douleur a été mise en œuvre	Cocher **« OUI »** s'il est retrouvé une stratégie de prise en charge de la douleur et sa mise en œuvre dans le dossier du patient. Cocher **« NON »** si aucune stratégie de prise en charge de la douleur n'est retrouvée dans le dossier du patient ou lorsque la mise en œuvre n'est pas retrouvée (prescription sans administration, pas de compte rendu de réalisation de la mise en œuvre de moyens « non médicamenteux » ou lorsque l'information est illisible.
EXP_PCD SSR 6	Quelle stratégie a été mise en œuvre	Cette question ne s'affiche que si réponse « Oui » à la question EXP_PCD SSR5. Si plusieurs stratégies sont mises en œuvre ne préciser que la première. Cocher **« Moyens médicamenteux » si sont tracés dans le dossier :** • prescription d'antalgique **ET** son administration, • protocole **ET** son administration, • prescriptions médicamenteuses (infiltration de corticostéroïdes, …) **ET** leur administration. Cocher **« Moyens non médicamenteux » si sont tracés dans le dossier :** ergothérapie, kinésithérapie, positionnement, orthèse, hypnose, jeux en pédiatrie, écoute, attention ET compte rendu **OU** information sur la réalisation de la mise en œuvre du (des) moyen(s) non médicamenteux. **Remarque :** les prescriptions conditionnelles doivent être précisées.
EXP_PCD SSR 6.1	Si moyen non médicamenteux préciser :	Cette question ne s'affiche que si réponse 2 (Moyen non médicamenteux) coché à la question EXP_PCD SSR 6 Préciser le moyen mis en œuvre
EXP_PCD SSR 7	Date de mise en œuvre de la stratégie de prise en charge de la douleur	**« Moyens médicamenteux » :** Noter la date de l'administration du premier traitement **« Moyens non médicamenteux »** Noter la date du début de la prise en charge
EXP_PCD SSR 8	Pour les patients algiques une seconde évaluation de la douleur a été réalisée	Cette question ne s'affiche que si réponse « OUI » à la question EXP_PCD SSR 4 Cocher **« Oui »** si le résultat d'une mesure de la douleur à l'aide d'une échelle ou lorsqu'un commentaire sur l'état douloureux après la mise en œuvre de la stratégie de prise en charge est retrouvé. Cocher **« Non »** lorsqu'aucun commentaire ni résultat d'une mesure de la douleur à l'aide d'une échelle après la mise en œuvre de la stratégie de prise en charge n'est retrouvé.

EXP_PCD SSR 9	Si oui cette évaluation a été réalisée avec une échelle	Cette question ne s'affiche que si réponse « Oui » à la question EXP_PCD SSR 8 Cocher **« OUI »** si l'évaluation a été réalisée avec l'une des échelles suivantes : • Echelle Verbale Simple (EVS), • Echelle Numérique Simple en cm (ENS), • Echelle Numérique en mm (EN), • Echelle Visuelle Analogique en cm (EVA), • Echelle Visuelle Analogique en mm (EVA), • Algoplus (échelle de 0 à 5), • FLACC (échelle de 0 à 10), • Cheops (score de 4 à 13), • Echelle des visages (0 à 10), • Échelle locale validée par le CLUD. Cocher **« NON »** si l'évaluation n'a pas été réalisée avec une de ces échelles.
EXP_PCD SSR 10	Date de réalisation de la seconde évaluation de la douleur	Cette question ne s'affiche que si réponse « Oui » à la question EXP_PCD SSR 8

GRILLE DE RECUEIL DE L'INDICATEUR PCD

Indicateur en expérimentation à remplir uniquement par les établissements volontaires : Prise en Charge de la Douleur (PCD - SSR)		
EXP_PCD SSR 1	Une évaluation de la douleur est tracée dans le dossier du patient	○ 1. Oui ○ 0. Non
EXP_PCD SSR 2	Si oui cette évaluation a été réalisée avec une échelle	○ 1. Oui ○ 0. Non
EXP_PCD SSR 3	Date de réalisation de la première évaluation de la douleur	□□ / □□ / □□□□
EXP_PCD SSR 4	Cette première évaluation montre que le patient est algique (EVA > 3, voir correspondance des échelles)	○ 1. Oui ○ 0. Non
EXP_PCD SSR 5	Pour les patients algiques une stratégie de prise en charge de la douleur a été mise en œuvre	○ 1. Oui ○ 0. Non
EXP_PCD SSR 6	Quelle stratégie a été mise en œuvre	○ 1. Moyens médicamenteux ○ 2. Moyens non médicamenteux
EXP_PCD SSR 6.1	Si moyen non médicamenteux préciser :	_____
EXP_PCD SSR 7	Date de mise en œuvre de la stratégie de prise en charge de la douleur	□□ / □□ / □□□□
EXP_PCD SSR 8	Pour les patients algiques une seconde évaluation de la douleur a été réalisée	○ 1. Oui ○ 0. Non
EXP_PCD SSR 9	Si oui cette évaluation a été réalisée avec une échelle	○ 1. Oui ○ 0. Non
EXP_PCD SSR 10	Date de réalisation de la seconde évaluation de la douleur	□□ / □□ / □□□□
EXP_PCD SSR 1	Une évaluation de la douleur est tracée dans le dossier du patient	○ 1. Oui ○ 0. Non
EXP_PCD SSR 2	Si oui cette évaluation a été réalisée avec une échelle	○ 1. Oui ○ 0. Non
EXP_PCD SSR 3	Date de réalisation de la première évaluation de la douleur	□□ / □□ / □□□□
EXP_PCD SSR 4	Cette première évaluation montre que le patient est algique (EVA > 3, voir correspondance des échelles)	○ 1. Oui ○ 0. Non