

BPCO : des indicateurs pour améliorer le parcours de soins

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie chronique qui touche plus de 3 millions de personnes en France. Pour aider les professionnels à évaluer leurs pratiques, après avoir défini le parcours de soins des patients, la HAS met à disposition les résultats nationaux et régionaux de 7 indicateurs mesurés dans le SNDS (Système national des données de santé) à différentes étapes de la prise en charge : dépistage, prise en charge des patients stables, suivi après hospitalisation.

7 indicateurs

7 points de vigilance pour améliorer la prise en charge

Ces résultats déterminent des pistes d'amélioration sur lesquelles vous pouvez agir !

Dépistage

Indicateur
Spirométrie ou EFR à visée diagnostique



Dépister les patients à risque

est fondamental pour ralentir l'évolution de la maladie et diminuer l'exposition aux facteurs de risque

20 % des patients identifiés à risque sont dépistés

Prise en charge des patients stables

Indicateur
Vaccin contre la grippe



Prévenir les complications

par la vaccination contre la grippe pour prévenir les infections respiratoires

50 % des patients sont vaccinés contre la grippe

Indicateur
EFR ou spirométrie annuelle



Surveiller la fonction respiratoire

par EFR ou spirométrie est importante pour ajuster ou renforcer les traitements

30 % des patients ont une surveillance annuelle de la fonction respiratoire

Suivi après hospitalisation

Indicateur
Suivi médical dans les 7 jours



Assurer un suivi médical

pour favoriser la continuité des soins et évaluer les besoins

40 % des patients sont suivis dans les 7 jours par leur médecin traitant

Indicateur
Suivi par le pneumologue dans les 2 mois



Assurer un suivi par un pneumologue

permet d'ajuster les traitements et surveiller la fonction respiratoire

30 % des patients sont suivis dans les 2 mois par un pneumologue

Indicateur
Traitement de BDLA dans les 3 mois



Initier et poursuivre le traitement

permet d'améliorer la fonction respiratoire et la qualité de vie

Plus de **70 %** des patients ont un traitement bronchodilatateur de longue durée d'action

Indicateur
Soins de rééducation dans les 3 mois



Mettre en œuvre des soins de rééducation

permet de prévenir les complications et améliorer la qualité de vie

30 % des patients sont pris en charge en rééducation dans les 3 mois

Consultez l'ensemble des résultats : www.has-sante.fr