

# Infection par le virus Monkeypox

## Vaccination

### Vaccins de 3<sup>e</sup> génération (interchangeables)

• IMVANEX®

• JYNNEOS®

#### Pré-exposition

- HSH et/ou personnes transgenres multi-partenaires.
- Travailleurs du sexe.
- Professionnels de lieux de consommation sexuelle.

- 2 doses.
- Délai : 28 jours minimum.
- 1 seule dose si déjà vaccinée pour variole.

#### Personne VIH (non déjà vaccinée)

- CD4 > 200 : 2 doses
- CD4 < 200 : 3 doses

#### Personne immunodéprimée (non VIH) : 3 doses

#### Post-exposition

- Personnes contact à risque.
- Idéal dans les 4 jours, max à J 14 après 1<sup>er</sup> contact.
- Cf. fiche « [Personnes contact à risque d'être contaminées](#) ».

- 2 doses.
- Délai : 28 jours minimum.
- 1 seule dose si déjà vaccinée pour variole.
- Immunodéprimé : 3 doses ou 2 doses (si patient VIH déjà vaccinée pour variole).

#### Avis spécialisé

- Femmes enceintes, allaitantes.
- Enfants et nouveaux-nés.

### Tolérance – Effets indésirables – Précautions d'emploi

- Réactions au site d'injection, quelques réactions systémiques d'intensité légère à modérée – Note d'information ANSM : [cliquer ici](#)
- Déclaration des effets indésirables : [cliquer ici](#)
- Administration concomitante d'un autre vaccin (voir FAQ de la fiche HAS « [Réponse Rapide : Infection par le virus Monkeypox – Prise en charge en médecine de 1<sup>er</sup> recours](#) »).

### Liste des centres de vaccination ([cliquer ici](#))



Une ligne téléphonique, « Monkeypox Info Service », est mise en place par Santé Publique France gérée par SIS-association (Sida Info Service) au **0 801 90 80 69, 7 jours sur 7, de 8h à 23h**, pour répondre aux éventuelles interrogations.

Contact : cf. fiche HAS « [Réponse Rapide : Infection par le virus Monkeypox – Prise en charge en médecine de 1<sup>er</sup> recours](#) » | Déclaration obligatoire : [www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa\\_12218\\_02.do](http://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12218_02.do)